

## Diagnostische checklist voor depressie bij bewoners met dementie: PDC-dAD criteria

Deze paragraaf bevat de checklist die gebruikt kan worden voor het stellen van de diagnose depressie bij dementie. In de paragraaf 4.3.4 is ter ondersteuning hiervoor een uitgebreide toelichting geschreven, inclusief de PDC-dAD criteria en drie casuïstieken.

### Stap 1. Bepaal of de volgende hoofdsymptomen voorkomen.

Elk symptoom moet op de meeste dagen, meerdere uren per dag, gedurende een periode van twee weken aanwezig zijn geweest. Elk symptoom moet wijzen op een verandering ten opzichte van het eerdere functioneren.

	ja	nee
(1) Klinisch significante depressieve stemming (b.v. depressief, triest, hopeloos, ontmoedigd, tranen)		
(2) Verminderde positieve reactie op of plezier in sociale contacten of gebruikelijke activiteiten		
Is er minstens één van de hoofdsymptomen aanwezig? > Zo <b>JA</b> : ga naar <a href="#">Stap 2</a> > Zo <b>NEE</b> : ga naar <a href="#">Stap 4</a> en vul 'Vaststellen van depressiesymptomen' in		
<b>Stap 2. Bepaal of de volgende symptomen voorkomen</b> (dezelfde voorwaarden als bij de hoofdsymptomen)		
(3) Verstoring van de eetlust		
(4) Verstoring van de slaap		
(5) Psychomotore veranderingen (b.v. agitatie of remming)		

	ja	nee
(6) Moeheid of energieverlies		
(7) Gevoelens van waardeloosheid, hopeloosheid, buitensporige of ongepaste schuldgevoelens		
(8) Terugkerende gedachten over de dood, suicide ideaties, -plannen, -pogingen		
(9) Sociale isolatie / terugtrekken		
(10) Prikkelbaarheid		
Zijn er tenminste 3 items aanwezig van (1) t/m (10)? > Zo <b>JA</b> : ga naar <a href="#">Stap 3</a> en vul 'Vaststellen van Depressie' in > Zo <b>NEE</b> : ga naar <a href="#">Stap 4</a> en vul 'Vaststellen van depressiesymptomen' in		
<b>Stap 3. Vaststellen van Depressie bij Dementie</b>		
(A) Tenminste 3 items aanwezig van (1) t/m (10), inclusief (1) en/of (2)		
(B) Aan alle DSM-criteria voor dementie wordt voldaan? *		
(C) Er is sprake van klinisch relevant lijden of verstoord functioneren		

(\* In het kader van Doen bij Depressie hoeft voor deze checklist geen uitvoerige dementie diagnostiek plaats te vinden. Het is echter belangrijk dat de bewoner bekend is als iemand met dementie.)

	ja	nee
(D) De symptomen komen niet uitsluitend voor tijdens een delirium		
(E) De symptomen zijn niet het directe gevolg van een fysiologische reactie op een middel (drugs of medicatie)		
(F) De symptomen zijn niet beter te verklaren door een depressieve episode, bipolaire stoornis, rouw, schizofrenie, schizoaffectieve stoornis, psychose in het kader van de dementie, angststoornis of een aan middelen gerelateerde stoornis		
<p>Wordt er voldaan aan criteria A t/m F? (overal JA ingevuld)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zo <b>JA</b>: Diagnose depressie bij Dementie. Vul dit in op het <a href="#">Communicatieformulier</a>.</li> <li>➤ Zo <b>NEE</b>: Ga naar Stap 4 en vul 'Vaststellen van depressiesymptomen' in</li> </ul>		
<b>Stap 4. Vaststellen van Depressiesymptomen</b> Wanneer bewoner niet voldoet aan criteria voor Depressie bij Dementie		
<p>(DS1) Had bewoner in fase Screenen GDS-8 <math>\geq 3</math> of CSDD <math>\geq 8</math>?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zo <b>JA</b>: Diagnose depressiesymptomen. Vul dit in op het <a href="#">Communicatieformulier</a></li> <li>➤ Zo <b>NEE</b>: Geen Depressiesymptomen. Vul dit in op het <a href="#">Communicatieformulier</a></li> </ul>		