



Stappenplan


Apathie bij Korsakov

Een praktisch stappenplan waarmee de eerste verantwoordelijke verpleegkundige (EVV) aan de slag kunt met SABA-Korsakov.


SABA-Korsakov in de praktijk begint hier



Besprek in een teamoverleg bij welke bewoner je signalen van apathie herkent. Bekijk eventueel de *animatie*. Kies bij welke bewoner je SABA-Korsakov gaat inzetten.



De EVV geeft de naasten en/of mentor de *informatiefolder*, zo weten zij dat wij werken met SABA-Korsakov.



De EVV gaat in gesprek met de naasten/mentor over de apathie bij deze bewoner. De *praatplaat* kan worden gebruikt als leidraad bij het gesprek. Dit gesprek geeft informatie over het soort apathie en over interesses en kwaliteiten van de bewoner. Deze informatie kan de EVV later gebruiken om het *PAP-A* in te vullen.



Besprek deze bewoner in een teamoverleg met de regiebehandelaar. De EVV laat de regiebehandelaar de *handreiking bewonersbespreking* gebruiken. Zo verzamel je informatie bij het team waarmee later het *PAP-A* kan worden ingevuld.



De EVV vult het *PAP-A* in en kiest welke dagelijkse bezigheden en plezierige activiteiten kunnen worden ingezet om de apathie bij deze bewoner te onderbreken. Maak eventueel gebruik van het *activiteitenblad* ter inspiratie. De EVV maakt ook afspraken met collega's en de naasten/mentor over wie wat doet bij het onderbreken van de apathie.



De EVV maakt een rapportagedoel/rapportagedoelen aan in het systeem. Zo kunnen verschillende collega's op dit doel rapporteren.



Het *PAP-A* evalueren wordt een vast punt op de agenda.

[www.ukonnetwerk.nl/
tools/saba-korsakov](http://www.ukonnetwerk.nl/tools/saba-korsakov)

